

Til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

20/15573-181

12.07.2023

## Informasjonsbrev nr. 57 om koronavaksinasjonsprogrammet

Dette brevet inneholder informasjon om:

1. Målgrupper for ny oppfriskningsdose før høst-/vintersesongen 23/24
2. Endring i anbefaling om grunnvaksinasjon
3. Oppdatert koronavaksine til høsten
4. Bruk av private tjenesteytere ved koronavaksinasjon

### 1. Målgrupper for ny oppfriskningsdose før høst-/vintersesongen 23/24

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

- Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
- Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,
- Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom,
- Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering.
- Gravide

Formålet med koronavaksinasjon er å redusere risikoen for alvorlig forløp av infeksjon hos den enkelte vaksinerte. Folkehelseinstituttet har på bakgrunn av forventet videre smitteutvikling og oppdatert kunnskap foretatt en vurdering av behovet for ytterligere doser koronavaksine til høsten, og har altså anbefalt samme målgrupper som høsten 2022.

#### Helsepersonell

Folkehelseinstituttets vurdering er at det ikke er grunnlag for å gi en egen anbefaling om en ny oppfriskningsdose til helsepersonell. Helsepersonell som tilhører en risikogruppe anbefales vaksine. Vurdering av vaksinasjon av helsepersonell gjøres ut ifra behov for individuell beskyttelse, behov for å beskytte pasienter mot smitteoverføring og behov for å sikre kapasiteten i helsetjenesten. Avgjørende for vurderingen

er i hvilken grad en ny oppfriskningsdose til helsepersonell kan gi disse effektene, og hvor lenge slike effekter vil vare, samt at den individuelle nytten sikkert må overstige eventuelle ulemper.

Oppslutningen om tidligere anbefalte doser koronavaksine er høy blant helsepersonell. I tillegg har mange også gjennomgått infeksjon og dermed opparbeidet seg hybrid immunitet som ser ut til å gi bedre beskyttelse enn vaksinasjon alene. Behovet for økt individuell beskyttelse er dermed for de fleste lav.

Nytten av å vaksinere helsepersonell for å beskytte pasientene er foreløpig usikker. . Det vurderes som mer effektivt å beskytte målgruppene med høyest risiko for alvorlig sykdomsforløp enn å basere seg på indirekte beskyttelse som vil avta raskere. En ny oppfriskningsdose til helsepersonell kan gi en økt beskyttelse mot å bli smittet med koronaviruset, men denne effekten er trolig kortvarig.

Når den antatte individuelle nytten ved en ny dose er lav, vil kravene til sikkerhet ved vaksinasjon vektas enda høyere i nytte-risiko-vurderingen. Helsepersonell er i stor grad personer under 65 år med et immunforsvar som responderer godt på vaksinasjon. Dette innebærer også noe høyere frekvens av de vanlige vaksinebivirkningene sammenliknet med eldre og syke, og risiko for sjeldne men alvorlige bivirkninger som f.eks. myokarditt og kraftige menstruasjonsblødninger.

#### Andre med behov for oppfriskningsdose

Enkelte som er utenfor de gruppene som er anbefalt en ny oppfriskningsdose denne høsten, vil ha behov for eller ønske om oppfriskningsdose av andre årsaker. Dette kan være grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold. Kommunene oppfordres til å legge til rette for at også disse kan få en oppfriskningsdose.

## **2. Endring i anbefaling om grunnvaksinasjon**

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Det har gjennom pandemien vært en høy oppslutning om koronavaksinasjonsprogrammet og i tillegg har mange gjennomgått covid-19 én eller flere ganger. Dette innebærer at de aller fleste har en form for grunnimmunitet mot SARS-CoV-2 og behovet for grunnvaksinasjon er mindre nå enn det var tidligere i pandemien når flere var immunologisk naive.

Følgende grupper anbefales imidlertid fortsatt grunnvaksinasjon dersom denne ikke allerede er fullført, uavhengig av gjennomgått infeksjon:

- 65 år og eldre
- Personer i aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
- Barn og ungdom (5–17 år) med alvorlig grunnsykdom
- Barn 6 md.–4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering
- Gravide

I tillegg til grunnvaksinasjon anbefales disse gruppene å følge gjeldende råd om oppfriskningsdoser.

## **3. Oppdatert koronavaksine til høsten**

WHO, EMA og FDA har anbefalt at koronavaksinene oppdateres før høstens vaksinasjonskampanje til kun å dekke nye undervarianter av omikron. Det er imidlertid ikke endelig avklart når en slik oppdatert vaksine kan leveres til Norge. FHI vil komme tilbake med mer detaljert informasjon om bestilling og distribusjon når dette er nærmere avklart etter sommeren.

#### **4. Bruk av private tjenesteytere ved koronavaksinasjon**

Direkteoppgjørsordningen for private tjenesteytere som har avtale med kommunene opphørte 30. Juni 2023. Kommunene står fritt til å etablere samarbeidsavtaler med private aktører, men må da betale tjenesteyteren direkte.

Vennlig hilsen

Are Stuwitz Berg  
Avdelingsdirektør Smittevern og vaksine

Brevet er elektronisk godkjent

Kopi til HOD og Hdir