

## Skjema 1B: Retningslinjer for utlevering av eventuell medisin ved Meland sjukeheim når lege ikkje er tilgjengeleg

1. Sjukepleiar vurderar pasienten sin tilstand og behov for medikasjon.
2. Anna kvalifisert helsepersonell skal i forkant av utleveringa konferera med sjukepleiar.
3. Desse preparata kan gjevast ved desse indikasjonane og i denne doseringa:

Preparat	Indikasjonar	Dosering
Paracet 500 mg supp eller tablett	Hovudverk Muskelsmerter Feber	1-2 tabl eller supp inntil 3 gonger per døgn Max 4 g per døgn
Kloramfenikol øyesalve/ dr	Øyekatarr med puss.	Salve x 2 Dråper x 4
Stesolid Klyster/ rekatalløsning 10 mg	Generelle kramper Obs! Lege skal kontaktast etter medisinerings om pas ikkje har kjend epilepsi.	10 mg ( 1 klyster)
Adrenalin inj	Anafylaksi	Sjå eigen instruks
Afipran supp 20 mg / Afipran tabl 10 mg	Kvalme og oppkast	1 stikkpille/ 1 tabl inntil 3 gonger per døgn
Imodium ( Loperamid) 2 mg	Diare utan feber	1-2 tabl inntil x 2
Nitroglyserin tabl 0,5 mg	Brystsmerter 1 tablett under tungen	Kan gjentas. Lege kontaktes ved manglande effekt
<b>Avføringsmidler</b>	Til einskildpasientar etter vurdering av sjukepleiar	Drøfting med lege ved neste visitt
Dulcolax tabl		2 tabl kveld
Pursennid tabl		2-4 tabl kveld
Microlax miniklyster		1 tube rectalt
Klyx		120 ml rectalt
Oljeglyserol klyster		
Betulac		
Laxoberal dr		5-10 dr kveld